




La inyección anticonceptiva

Funcionamiento y uso correcto

Los métodos anticonceptivos inyectables disponibles en Ecuador se clasifican en dos grupos:

1. Inyección anticonceptiva con una sola hormona (progesterona). Se vende bajo los nombres de Depo-provera y Topasel. Depo-provera se coloca cada 3 meses; Topasel cada mes.
2. Inyección anticonceptiva con dos hormonas (progesterona+ estrógeno). Se vende bajo el nombre de Mesygina. Se coloca cada mes.



La inyección se administra cada mes o cada tres meses, en la nalga o la parte superior del brazo.

Todas las inyecciones anticonceptivas tienen un uso similar. Para iniciar con la primera inyección Ud. debe esperar el primer día de la regla o **menstruación**, día en el cual el médico luego de algunas preguntas y de un control general de su salud, colocará la inyección en la nalga o en la parte superior del brazo. La inyección no es dolorosa. La siguiente inyección será colocada 30 días después de la primera y así sucesivamente cada mes hasta que Ud. decida suspender para tener un hijo. En el caso de Depo-provera, tendrá que visitar su médico para la inyección cada 3 meses.

A partir de la primera inyección usted queda protegida para evitar un embarazo.

Funciona durante...

1 mes o 3 meses (12 semanas), dependiendo del tipo de inyección

Ventajas

Muy confiable
Una forma secreta de anticoncepción

No hay que pensar en tomar un anticonceptivo todos los días. Solamente tiene que ir al médico una vez al mes o cada 3 meses (Depo-provera)

Ventajas exclusivas de la inyección con una sola hormona (Topasel y Depo-provera)

Puede ser usado en la etapa de lactancia a partir de los 6 meses (Topasel, Depo-provera).

La [menstruación](#) es menos dolorosa y más ligera. Después de un año, es posible que no llegue más.

Desventajas

La inyección no protege contra [VIH/SIDA](#) y otras enfermedades de transmisión sexual.

Desventajas exclusivas de la inyección con una sola hormona (Topasel, Depo-provera)

Durante el primer año de uso pueden ocurrir pérdidas irregulares de sangre.

Cuando se decide no usar más este método, toma un tiempo relativamente largo (de 3 a 15 meses) hasta que se regularice el propio ciclo hormonal y Ud. pueda resultar embarazada. Por esta razón, no se aconseja este método a mujeres que deseen tener hijos a corto plazo.

Puede ocurrir un pequeño aumento del peso.

¿Dónde se consigue la inyección y qué precio tiene?

Se puede comprar la inyección anticonceptiva en la farmacia con receta médica. Las marcas disponibles son:

DEPO PROVERA (11 a 12 USD cada 3 meses),

TOPASEL (4 a 5 USD cada mes)

MESYGINA (5 a 6 USD cada mes)

SALUD DE ALTURA - Jorge Washington E4-54 y Amazonas - 7° piso - Quito - 290 8064 / 255 1501